

Прививка против клещевого энцефалита вакциной ТикоВак Джуниор

ТикоВак Джуниор – вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная (производитель - Бельгия).

Вирус клещевого энцефалита может вызывать тяжелые инфекции головного и спинного мозга, которые начинаются с головной боли и повышения температуры тела. Наиболее тяжелые формы заболевания могут приводить к потере сознания, наступлению комы и летальному исходу.

Вирус клещевого энцефалита переносится клещами, передается человеку при укусах клеща.

В большей части Европы, а также Центральной и Восточной Азии существует высокая вероятность укуса клеща и заражения вирусом.

Вакцина ТикоВак Джуниор показана для активной (профилактической) иммунизации детей в возрасте от 1 года до 15 лет против клещевого вирусного энцефалита.

Вакцина вводится внутримышечно в верхнюю часть плеча (в дельтовидную мышцу), детям в возрасте до 18 месяцев - в бедро (в латеральную широкую мышцу бедра).

Вакцинация **ТикоВак Джуниор** бывает **плановая и экстренная.**

Схема плановой иммунизации состоит из трех инъекций **ТикоВак Джуниор**: по 1 дозе вакцины (0,25 мл) с интервалом между первой и второй вакцинацией **1-3 месяца; между второй и третьей вакцинацией 5-12 месяцев.**

Первую и вторую вакцинации лучше всего выполнять зимой, что позволяет получить достаточную защиту перед началом сезона активности клещей, который обычно начинается весной.

Ревакцинация через три года после третьей прививки.

Схема экстренной иммунизации состоит из трех инъекций **ТикоВак Джуниор**: по 1 дозе вакцины (0,25 мл) с интервалом между первой и второй вакцинацией **14 дней; между второй и третьей вакцинацией 5-12 месяцев.**

Ревакцинация через три года после третьей прививки.

Последующие ревакцинации проводятся каждые 5 лет.